



ČELEĎ: **MIŘÍKOVITÉ**

Pěstované


Planě rostoucí

Charakteristické znaky

Květenství OKOLÍK nebo




SLOŽENÝ OKOLÍK



DUTÝ STONEK

(Podélně rýhovaný)

PLODY JSOU DVOUNAŽKY




LISTY ZPEŘENÉ NEBO NĚKOLIKANÁSOBNĚ ZPEŘENÉ

OBSAHUJÍ SILICE

– charakteristická vůně a chuť

Některé jsou nebezpečné!!!



A) PĚSTOVANÉ

kořenová zelenina



květenství


7



8

plody

MRKEV OBECNÁ



PETRŽEL ZAHRADNÍ

Pěstuje se pro kořen a listy.



Petržel kořenová



Petržel listová – 10 kadeřavá



CELER MIŘÍK

CELER BULVOVÝ – kořen

CELER LISTOVÝ – nať

Obsahuje vitamíny, silice,
vitamín B1, B2, C, sodík,
vápník, hořčík, fosfor, draslík.



PĚSTOVANÉ KOŘENÍ

FENYKL OBECNÝ



23

PLODY – KOŘENÍ



14

KOPR VONNÝ



13

Pěstuje se pro listy.

KMÍN KOŘENNÝ




PLODY – KOŘENÍ



KORIANDR SETÝ

PLODY – KOŘENÍ



ANÝZ VONNÝ

Je vhodným kořením do vánočního cukroví, koláčů, sladkých jídel, přidává se i do švestkových povidel. Lze jím okořenit i chléb. Lékořicové aroma díky anýzu získávají také různé likéry, např. pastis, anisette, ricard či sambuco.



B) PLANĚ ROSTOUCÍ

KERBLÍK LESNÍ



BRŠLICE KOZÍ NOHA



Bršlice kozí noha

BOLŠEVNÍK OBECNÝ – až 1 m



BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ – až 4 m



Dovezen z Asie.

Je nebezpečný – obsahuje FURANOKUMARINY – kožní vyrážky, puchýře, pigmentové skvrny, otoky, poruchy zraku.

BOLEHLAV PLAMATÝ




Bylina vysoká 1–2,5 m

POZOR!!!

**Celá rostlina je
jedovatá.**

Zopakujeme si



- 1) Jaké je rodové a druhové jméno rostliny, podle níž je pojmenována tato čeleď?

MIŘÍK CELER

- 2) Které zeleniny patří do čeledi miříkovitých?

MRKEV, PETRŽEL, PASTINÁK, CELER MIŘÍK, KOPR VONNÝ

- 3) Jak se nazývá květenství miříkovitých?

OKOLÍK NEBO SLOŽENÝ OKOLÍK

- 4) Jaké listy mají miříkovité?

SLOŽENÉ – ZPEŘENÉ

- 5) Vyjmenuj alespoň jeden plevel z čeledi miříkovitých.

BRŠLICE KOZÍ NOHA